

**Depiction of Health**  
2020; 11(3): 298-299  
<http://doh.tbzmed.ac.ir>

## Corrigendum to: Priorities of Active Aging Policy in Iran

**Zeinab Gholipour<sup>1</sup>**, **Mahmood Mahmoodi Majd Abadi Farahani\*<sup>1</sup>**, **Leila Riahi<sup>1</sup>**, **Kamran Hajinabi<sup>1</sup>**  
*Depiction of Health. 2020;11(1): 52-61*

On the page 52 in english abstract and 53, in abstract section, line 5 and 55 column first paragraph, the method section of article the method of conducting is quantitative-qualitative and in terms of time it is cross-sectional. The reliability of the questionnaires was determined through re-testing and Cronbach's alpha coefficient, which was .872% for the whole questionnaire and 85% correlation coefficient. In the present study, a researcher-made questionnaire based on a comparative study was used and 41 questions were asked.

In the following, in order to enter the stage of exploratory factor analysis, the adequacy of the data was first measured, for which the KMO Bartlett's test, which was 0.952, was used. 10% of the articles were coded by 3 people with a doctorate degree and work experience or research in the field of aging in the introductory stage, and the coefficient of agreement was 85%, and in the next stage, the whole sample was examined by one of them.

Also, in page 56 the title of Table 2 is "Results of Comparative Studies of Active Aging Management for Iran".

DOI: 10.34172/doh.2020.37

---

1. Department of Health Services Management, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Email: mahmoodim@tums.ac.ir)

## اصلاحیه به: اولویت‌های سیاست‌گذاری سالمندی فعال برای ایران

زینب قلی پور<sup>۱</sup>، محمود محمودی مجدآبادی فراهانی<sup>\*</sup>، لیلا ریاحی<sup>۱</sup>، کامران حاجی نبی<sup>۱</sup>

تصویر سلامت، ۱۳۹۸؛ ۱۱(۱): ۵۲-۶۱.

در صفحه ۵۲ قسمت چکیده انگلیسی و ۵۳ در قسمت مواد و روش‌های چکیده و صفحه ۵۵ پاراگراف اول قسمت روش انجام پژوهش کمی - کیفی و در زمره‌ی پژوهش‌های توصیفی و به لحاظ زمان مقطعی بود.

تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها از طریق آزمون - آزمون مجدد و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که برای کل پرسش‌نامه برابر با ۰/۸۷۲ و ضریب همبستگی ۸۵ درصد بود. در تحقیق حاضر از پرسش‌نامه ساخته دست پژوهشگر که بر اساس مطالعه تطبیقی می‌باشد، استفاده گردید و تعداد ۴۱ سؤال مطرح شد. در ادامه، به منظور ورود به مرحله‌ی تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا کفایت داده‌ها سنجیده شد که برای این کار از آزمون بارتلت KMO که میزان آن ۰/۹۵۲ به دست آمد، بهره گرفته شد. ۱۰ درصد از مقالات توسط ۳ نفر با تحصیلات دکترا و سابقه کار و یا پژوهش در حوزه‌ی سالمندی مرحله‌ی مقدماتی کدگذاری شد و ضریب توافق ۸۵ درصد بود و در مرحله‌ی بعد تمام نمونه توسط یکی از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در صفحه ۵۶ عنوان جدول ۲ «نتایج مطالعات تطبیقی مدیریت سالمندی فعال برای ایران» می‌باشد.

۱. گروه خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: mahmoodim@tums.ac.ir)

حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است. این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سلامت مجوز کپی‌رایت کامنز (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0) منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.